

Baltakaktė žąsis

Lietuvoje stebima tik sezoninių perskridimų metu: pavasarį dažniausiai kovo antroje pusėje - balandžio mėn. pradžioje, rudenį - spalio mėn. Peri tundroje, prieraši prie atvirų, kiek kalvotų plotų su vandens telkiniais (ežerais, upėmis). Suka nesudėtingus lizdus didesniuose žolių kupstuose ar vešlesniuose žolių kuokštuose. Perimvietėse įsikuria pavienėmis poromis užimdamos dideles lizdines teritorijas. Deda 3 - 7 baltus, balsvus su gelsvu atspalviu kiaušinius. Peri tik patelė apie 27 paras. patinas akylai augo lizdą išpėdamas patelę apie pavojų. Perėjimo metu - tundra, migracijų metu poilsiu pasirenka atviresnius, retai žmonių lankomus vandens telkinius. Maitinasi daugiausiai minkštosiomis augalų dalimis, žiemkenčių želmenimis. Labai mėgsta laikinai užtvindytus plotus (laukus, pievas).

Kūnas 65-70 cm ilgio, sveria apie 2-3 kg. Viršutinė kūno dalis rusvai pilka. Kakta balta. Plasnojamosios plunksnos juodai rudos su baltais stiebais. Juodai rudų vairuojamųjų plunksnų viršūnės baltos. Krūtinė ir pilvas šviesiai pilki su netaisyklingos formos juodomis dėmėmis. Pauodegys baltas. Snapas rausvai geltonos spalvos su baltu nagu. Kojos raudonai geltonos. Jaunų paukščių kakta pilka, apatinė kūno pusė be juodų dėmių. Snapas pilkšvas. Įprasta migruojanti rūšis. Sudaro apie 1/5 visų praskrendančių žąsų. Sudaro mišrius būrius su kitomis žąsų rūšimis.

Aptinkama įvairiose Lietuvos rajono vietose.