

Kuoduotoji antis

Patinas vestuviniu apdaru juodas, tik kūno šonai, pilvas ir veidrodelis balti. Ant pakaušio - ilgas, nusviręs kuodas. Patelės apdare vietoj juodos spalvos - ruda, o kuodas trumpesnis.

Lizdus dažniausiai krauna prie vandens, nendrynuose, meldynuose, aukštų žolių kupstuose, plaukiojančiose salose – plovose. Iš visų nardančių ančių Lietuvoje peri gausiausiai. Kiaušinius dėti pradeda kiek vėliau nei kitos ančių rūšys – balandžio pabaigoje. Dėtyje būna nuo 5 iki 18 pilkų su žalsvu atspalviu kiaušinių. Tokias dideles dėtis nulemia tai, kad labai dažnai kuoduotosios antys turi bendras dėtis. Patelė vidutiniškai peri 25 paras. Jaunikliai išsiriti birželio pabaigoje - liepos pradžioje. Jaunikliai pradeda skraidyti sulaukę 50 dienų amžiaus.

Maisto ieško pasinerdamos į iki 6 metrų gylį. Daugiausia minta gyvūninės kilmės maistu: moliuskais, vėžiagyviais, vabzdžių lervomis, rečiau smulkiomis žuvelėmis. Augalinio maisto sulesa labai mažai.

Aptinkama vandens telkiniuose, kuriuose yra salų, vešli vandens augalija, tankūs nendrynų plotai. Perėjimui pasirenka salos augalijos sąžalynus, plaukiojančių nendrių, švendrų sąnašas.

Lietuvoje perinti populiacija didėja. Populiacijos dydis: apie 3000 - 5000 perinčių porų.