

Ondatra

Ondatra panaši į vandeninį pelėną, tik gerokai didesnė. Kūnas kresnas, pasikūprinęs. Kaklas trumpas ir storas. Ausys vos matyti iš kailio. Kailiukas minkštas, tankus ir blizgantis. Jo spalva per metus beveik nekinta. Atskirų žvėrelių nugaros kailio spalva būna nuo šviesiai iki tamsiai rudos, per vidurį kartais eina juoda juosta. Šonai šviesesni už nugarą, krūtinė pilkšva, papilvė - smėlio spalvos. Kai kurių Lietuvos ondatrų, ypač gyvenančių Nemuno deltoje ir Žuvinto rezervate, kailiukas būna nuo pilkai rudos iki tamsiai pilkos spalvos. Jų papilvė pelėnų spalvos. Ondatroms tinkamiausi pakankamai gilūs, neiššalantys iki dugno ir gausūs augalų vandens telkiniai. Vengia atvirų, nuolat bangų skalaujamų pakrančių ir sraunių upių.

Gyvena urvuose arba trobelėse. Anga į urvą visada būna po vandeniu, apie 0,6 m gylyje. Šeimą paprastai turi 1 - 2 urvus; jie šakojasi ir jungiasi vienas su kitu.

Minta augalais ir smulkiais gyvūnais. Mitybai būdingas sezoniškumas. Šiltuoju metų periodu maiste vyrauja vandens augalų ūgliai, lapai, stiebai. Ėda visus vandens augalus, bet dažniausiai meldus, nendres, švendrus, ajerus, vandens lelijas, lūgnes, asiūklus, viksvas, plūdes, plunksnalapes, skėtinius bėžius, strėlalapes papliauškas, elodėjas, alijošinius aštirus, puplaiškius, o iš sumedėjusių augalų karklus.

Rudenį, žiemą ir anksti pavasarį minta vandens augalų šakniastiebiais ir gyvūniniu maistu (varlėmis, vėžiais, moliuskais, ypač dvigeldžiais, gyvavedėlis sraigėmis). Žuvimis minta tik apsigyvenusios tvenkiniuose, kur nėra vandens. Gyvena šeimomis. Poros išlieka kelerius metus. Veisiasi nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pabaigos.